

 Tecnocalidad	FICHA TECNICA PRODUCTO TERMINADO	FR-102-GC
		EDICIÓN : 1
NOMBRE DEL PRODUCTO	AMITOX	
NUMERO DE REGISTRO	ICA No.10258 - MV.	
FABRICANTE	Tecnocalidad S.A.S-Cota, Colombia.	
DESCRIPCION	AMITOX es un baño insecticida de uso externo del grupo de las formadimidinas; su acción se basa en interacción con los sistemas octopaminérgicos de los parásitos, produciendo su hiperestimulación generando la muerte del parasito expuesto.	
COMPOSICION	Cada 100 mL de producto contienen: Amitraz (N- metil bis (2,4 xililimino metil) amina).....20,8 g Excipientes c.s.p.....100 mL	
INDICACIONES	En bovinos para el control de garrapatas <i>Rhipicephalus microplus</i> y <i>Amblyomma cajennense</i> . En perros para el control de garrapatas <i>Rhipicephalus sanguineus</i> .	
ESPECIES DESTINO	En Bovinos y Caninos	
DOSIFICACION Y MODO DE USO	Bovinos: mezclar 1 mL de producto por litro de agua, bañar con 4 a 5 litros por animal adulto. Perros: mezclar 2,5 mL por cada 2 Litros de agua, bañe completamente el animal asegurando el contacto del producto con la piel. Perros pequeños: bañar con 2 Litros de la mezcla; perros grandes: bañar con 4 Litros de la mezcla. Se puede fumigar con la mezcla perreras, camas dejando secar utensilios antes de uso.	
FORMA DE ADMINISTRACIÓN	Vía Tópica.	
PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES	Use ropa protectora (guantes de caucho y mascarilla). Evite el contacto con la piel, si esto ocurre, lave inmediatamente con abundante agua y jabón. No almacene este producto junto a alimentos de animales, medicamentos, cocinas, alacenas o alimentos de uso humano. Realice la aplicación en lugares ventilados. No utilice en baños de inmersión No apto para animales menores de tres meses, o en estado de preñez o de raza Chihuahua}	
	El envase de este producto no puede reutilizarse. Por ningún motivo transporte alimentos o agua potable dentro de él. Después de usar	

	su contenido, enjuague tres veces este envase y vierta el agua en la mezcla de aplicación.
TIEMPO DE RETIRO	Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo Humano hasta 14 días después de finalizado el Tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 24 horas después de finalizado el mismo no debe darse el Consumo humano.
CONSERVACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL	Manténgase fuera del alcance de los niños y alejado de animales domésticos y alimentos. Manténgase a temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz y la humedad. El envase vacío deberá ser entregado al servicio de recolección posconsumo. Las cantidades que sobren después del baño deben ser eliminadas de acuerdo a lo establecido en la normatividad ambiental vigente para residuos peligrosos
VIDA UTIL	24 meses.
PRESENTACIÓN	Fco vidrio ámbar tipo III por 20 y 100mL. Fco COEX por 500 y 1000mL.