

 TecnoCalidad	FICHA TECNICA PRODUCTO TERMINADO	FR-102-GC
		EDICIÓN : 1
NOMBRE DEL PRODUCTO	ECTOVERMYN® 3.5%	
NUMERO DE REGISTRO	ICA No. 8942-MV	
FABRICANTE	Tecnocalidad S.A.S-Cota, Colombia.	
DESCRIPCION	ECTOVERMYN® 3.5% Es un endectocida de amplio espectro indicado para el control parásitos internos y externos (nematodos, garrapatas, piojos chupadores y ácaros de la sarna) presentes en los bovinos.	
COMPOSICION	Cada mL de la solución inyectable contiene: Ivermectina.....35mg Excipientes c.s.p.....1mL	
INDICACIONES	En Bovinos para el tratamiento y control de parásitos gastrointestinales: <i>Ostertagia ostertagi</i> , <i>Haemonchus placei</i> , <i>Trichostrongylus axei</i> , <i>Cooperia oncophora</i> , <i>Cooperia punctata</i> , <i>Cooperia sp.</i> , <i>Cooperia surnabada</i> , <i>Oesophagostomum radiatum</i> . Parásito pulmonar: <i>Dyctyocaulus viviparus</i> (adulto y L4). Parásitos externos: Nucho: ayuda en el control de : <i>Dermatobia hominis</i> (fase parasitaria). Piojos: <i>Linognathus vituli</i> , <i>Haematopinus eurysternus</i> , <i>Solenoptes capillatus</i> . Ayuda en el control de <i>Damalinia bovis</i> . Ácaros de la sarna: <i>Psoroptes communis var. Bovis</i> , <i>Sarcoptes scabiei var. Bovis</i> y <i>Chorioptes bovis</i> . Miasis causada por: <i>Cochliomyia hominivorax</i> . Ayuda en el control de las garrapatas: <i>Rhipicephalus (Boophilus) microplus</i> . Coadyuva en el control de la reinfestación causada por: <i>Trichostrongylus axei</i> , <i>Cooperia sp.</i> , por 42 días, <i>Ostertagia ostertagi</i> y <i>Oesophagostomum radiatum</i> por 49 días, <i>Dyctyocaulus viviparus</i> por 63 días. <i>Rhipicephalus (Boophilus) microplus</i> por 75 días , <i>Psoroptes comunnis var. bovis</i> por 56 días y <i>Dermatobia hominis</i> por 140 días.	
ESPECIES DESTINO	En Bovinos.	
DOSIFICACION Y MODO DE USO	1mL/50kg.	
FORMA DE ADMINISTRACIÓN	Vía subcutánea.	

PRECAUCIONES	No administrar en animales menores de 4 meses. No debe usarse en el último tercio de la gestación. No administrar el producto por vía endovenosa, ni por vía intramuscular. Proteja el envase del efecto de la luz. Elimine adecuadamente el envase de este producto, perfórelo y entierre en un lugar seguro. No elimine residuos de este producto a fuentes de agua, es nocivo para los peces. Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos. Venta bajo formula del Médico Veterinario.
TIEMPO DE RETIRO	Los Bovinos tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 122 días después de finalizado el tratamiento. No administrar a vacas en producción de leche para el consumo humano, ni dentro de los 122 días anteriores al parto.
CONSERVACIÓN	Consérvese a temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz.
VIDA UTIL	36 meses.
PRESENTACIÓN	Frasco en PEAD por 50, 250 o 500 mL.