

 Tecnocalidad	FICHA TECNICA PRODUCTO TERMINADO	FR-102-GC
		EDICIÓN : 1
NOMBRE DEL PRODUCTO	MIOCAN-T	
NUMERO DE REGISTRO	ICA No. 10262-MV	
FABRICANTE	Tecnocalidad S.A.S-Cota, Colombia.	
DESCRIPCION	MIOCAN-T compuesto por un AINE que trata el dolor y la inflamación, con selectividad preferencial COX-1. Su principio activo tiene un muy buen equilibrio entre eficacia y seguridad	
COMPOSICION	Cada 100 mL de suspensión oral contiene: Meloxicam.....0,15gr Excipientes.....100mL	
INDICACIONES	En perros como analgésico y antiinflamatorio en trastornos musculoesqueléticos agudos. En gatos como analgésico y antiinflamatorio en cirugías de tejidos blandos siempre que se administre previo al procedimiento quirúrgico.	
ESPECIES DESTINO	En Perros y Gatos.	
DOSIFICACION Y MODO DE USO	Perros: Durante el primer día realizar una administración única de 0.20 mg/kg en la practica 2 gotas por 1 kg de peso (1 mL por cada 7.5 kg de peso); Para continuar una dosis de 0.1 mg/kg (0.5 mL por cada 7.5 kg de peso) cada 24 horas durante máximo 5 días. Gatos: Administración única de 0,30 mg/kg en la practica 3 gotas por cada 1 kg de peso (1 mL por cada 5 kg de peso.)	
FORMA DE ADMINISTRACIÓN	Vía Oral	
PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES	En caso de que se presenten efectos secundarios adversos se debe suspender el tratamiento, evitar el uso del producto en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos ya que se aumenta el riesgo de toxicidad renal. No administrar junto a glucocorticoides u otros AINES. Ocasionalmente se han registrado reacciones adversas a los AINES, tales como pérdida del apetito, vómito, diarrea y sangre oculta en heces. Los efectos secundarios y la apatía desaparecen con la suspensión del tratamiento.	

	<p>Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos. Venta bajo fórmula del médico veterinario.</p> <ul style="list-style-type: none">• No usar en animales en gestación o lactancia.• No administrar en animales con trastornos gastrointestinales como irritación gástrica, hemorragias gastrointestinales, deterioro de la función hepática, cardíaca o renal.• No administrar en perros menores de 6 semanas de edad o en gatos menores de 2 Kg de peso.• En gatos debe prestarse especial atención en la exactitud de la dosis.
TIEMPO DE RETIRO	N/A.
CONSERVACIÓN	Consérvese a temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz.
VIDA UTIL	36 meses.
PRESENTACIÓN	Fco PEAD 60 y 120mL.