



## FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO

FR-102-GC

EDICIÓN :1

Página 1 de 2

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	<b>Oxitetraciclina 200</b>
<b>NUMERO DE REGISTRO</b>	8903-MV
<b>FABRICANTE</b>	Laboratorios TecnoCalidad S.A.S Km 2.5 vía Bogotá- Medellín vereda parcelas centro empresarial Portos sabana 80 Bodega 42 Correo electrónico: <a href="mailto:direcciongarantia@tecnoalidad.com.co">direcciongarantia@tecnoalidad.com.co</a>
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Esta indicado en enfermedades tales como: anaplasmosis, leptospirosis, pasteurelisis, mastitis, metritis, neumonías, infecciones articulares, colibacilosis y otros. Puede usarse como tratamiento preventivo en Fiebre de Embarque, infecciones postquirúrgicas y puerperales.
<b>COMPOSICIÓN</b>	Cada mL de solución inyectable contiene Oxitetraciclina HCL.....200mg; Excipientes.....1mL
<b>INDICACIONES</b>	En bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y aves para el tratamiento de enfermedades producidas por: <i>Anaplasma sp.</i> , <i>Streptococcus sp.</i> , <i>Clostridium sp.</i> , <i>Pasteurella sp.</i> , <i>Leptospira sp.</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Haemophilus sp.</i> , <i>Campylobacter sp.</i> , <i>Rickettsia sp.</i>
<b>ESPECIES DESTINO</b>	Bovinos, Porcinos, Ovinos, Caprinos y Aves
<b>DOSIFICACION Y MODO DE USO</b>	Bovinos, ovinos y porcinos 1 ml por cada 10 kpv. Bovinos y ovinos por vía intramuscular profunda. Cuando la dosis supera los 20 ml se debe aplicar en dos puntos. En lechones de menos de 2 kg de peso no se debe administrar más de 0.5 ml y únicamente por vía SC. Cerdos de más de 10 kg de peso 1 ml por cada 10 kg vía IM en un solo punto. Cerdos de más de 100 kg aplicar 1 ml por cada 10 kg de peso dividiendo la dosis en dos puntos diferentes de inyección. Estas dosis pueden modificarse de acuerdo con el criterio profesional. AVES Administrar vía Subcutánea. Aplicar 20 mg / Kg. peso. En la práctica: Aplicar 1 ml / 10 Kg. peso. AVES Aplicar 50 mg / Kg. peso. En la práctica: Aplicar 0.25 ml / Kg. peso.
<b>FORMA DE ADMINISTRACIÓN</b>	Intramuscular Profunda
<b>PRECAUCIONES</b>	Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos. Venta bajo fórmula del médico veterinario.

 TecnoCalidad	<b>FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO</b>	FR-102-GC
		EDICIÓN :1
		Página 2 de 2

<b>TIEMPO DE RETIRO</b>	Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 7 días después de finalizado el mismo, no debe darse para consumo humano.
<b>CONSERVACIÓN</b>	Manténgase a temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz y la humedad.
<b>PRESENTACIÓN</b>	Frasco por 50mL y 500mL.