



FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO

FR-102-GC

EDICIÓN :1

Página 1 de 2

NOMBRE DEL PRODUCTO	Oxitetraciclina 50
NUMERO DE REGISTRO	7954-MV
FABRICANTE	Laboratorios TecnoCalidad S.A.S Km 2.5 vía Bogotá- Medellín vereda parcelas centro empresarial Portos sabana 80 Bodega 42 Correo electrónico: direcciongarantia@tecnoalidad.com.co
DESCRIPCIÓN	Se recomienda su uso para tratar anaplasmosis, leptospirosis, pasteurelisis, mastitis, metritis, neumonías, infecciones articulares, colibacilosis y otros.
COMPOSICIÓN	Cada mL de solución inyectable contiene: Oxitetraciclina HCL.....50mg; Excipientes.....1mL
INDICACIONES	En bovinos, porcinos, ovinos, equinos para el tratamiento de infecciones ocasionadas por: <i>Anaplasma sp.</i> , <i>Clostridium sp.</i> , <i>Leptospira sp.</i> , <i>Haemophilus sp.</i> , <i>Campylobacter sp.</i> , <i>Listeria sp.</i> , <i>Rickettsia sp.</i> , <i>Streptococcus sp.</i> , <i>Escherichia coli</i> y <i>Pasteurella sp.</i>
ESPECIES DESTINO	Bovinos, Ovinos, Porcinos y Equinos
DOSIFICACION Y MODO DE USO	En Bovinos, Equinos, Porcinos y Ovinos para Anaplasmosis 16-26 mL/100kg cada 8 a 12 horas por 5 días. En otras enfermedades complicadas o producidas por los microorganismos antes mencionados 8-16mL/100kg por 5 días. En lavado uterino o vaginales diluir 40mL de producto en 50-100mL de agua destilada.
FORMA DE ADMINISTRACIÓN	Intramuscular, Lavados Uterinos o Vaginales.
PRECAUCIONES	Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos. Venta bajo fórmula del médico veterinario.



FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO

FR-102-GC

EDICIÓN :1

Página 2 de 2

TIEMPO DE RETIRO	Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 7 días después de finalizado el mismo, no debe darse para consumo humano.
CONSERVACIÓN	Manténgase a temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz y la humedad.
PRESENTACIÓN	Frasco por 20mL, 50mL, 100mL, 250mL y 500mL.